



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 06 du 06 Mars 2002 - 1 page

Grandes Cultures

COLZA : Stade D1 - D2 - Tige 20 cm

Charançons de la tige

Toujours **très peu de captures** (11 seulement). Dans le Sud de la région et sur la façade atlantique, on atteint le **stade de fin de sensibilité** (Tige 20 cm). Ailleurs, ce stade va être atteint rapidement. La **fin de semaine** va être **déterminante** pour le ravageur (température de 15°).

Les interventions sont inutiles actuellement.

La grande majorité des parcelles pourra être dispensée d'un traitement spécifique. Le point définitif sera développé dans le prochain bulletin.

Meligèthes

Deux captures seulement à ce jour. Les colzas sont **aux stades sensibles**. Les **seuils** ne sont **pas atteints** (voir dossier Avertel page 12 et note commune du bulletin précédent).

Traitement inutile actuellement.

Pucerons cendrés

Des colonies de pucerons cendrés correspondant à des reliquats d'automne sont observables dans certaines parcelles. **Les rechercher** dans les **boutons floraux**, où ils peuvent occasionner des avortements.

Une intervention avec un aphicide spécifique est à envisager si vous avez 1 à 2 foyers au mètre carré.

Maladies

Les cultures sont saines.

Les traitements sont inutiles.

POIS : stade levée à 4 feuilles

Les parcelles les plus précoces atteignent **4 feuilles** sur la **façade atlantique**. **Aucune activité** du ravageur n'est observée actuellement.

Il est trop tôt pour intervenir.

BLE : Stade fin tallage à épi 1 cm

Piétin-verse

Le **risque climatique** n'a pas évolué dans la plupart des situations.

Les indications du bulletin précédent restent valables.

Pour le risque parcellaire, une légère modification est proposée :

- Note de **10 à 11** : risque moyen ;
- Note **supérieure ou égale à 12** : risque élevé.

L'interprétation est modifiée en conséquence : la protection anti-piétin est considérée comme nécessaire à **partir de la note 12**.

Ne pas intervenir à court terme (même dans les situations les plus précoces).

Rappelons que les indications relatives à la gestion du risque de résistance figurent dans le bulletin n°01 du 31/01/2002.

Maladies foliaires

La septoriose est fréquemment observée (situation habituelle en fin d'hiver) ; l'oïdium est signalé ponctuellement sur variétés sensibles.

COLZA

Ravageurs :
Ne pas intervenir

POIS

Sitones :
Pas d'activité

Service Régional de la
Protection des Végétaux
13, route de la Forêt
86 580 BIAUD
Tél: 05.49.62.98.25
Fax: 05.49.62.98.26

Directeur gérant :
L. JUILLARD-CONDAT

Site Internet :
www.srpv-
poitoucharentes.com
E-mail :
srpv.draf-poitou-
charentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique
C.P.P.A.P. n°2139 AD
ISSN n°02294 470



D3 405 40830

7199